

SÉRIES DE POINCARÉ MOTIVIQUES D'UN GERME D'HYPERSURFACE IRRÉDUCTIBLE QUASI-ORDINAIRE

GUILLAUME ROND

RÉSUMÉ. Nous donnons ici une description combinatoire, faisant intervenir les exposants caractéristiques de la singularité, des arcs tronqués tracés sur un germe irréductible d'hypersurface quasi-ordinaire. Cela nous permet d'obtenir une expression inductive des séries de Poincaré de ce type de singularité.

TABLE DES MATIÈRES

1. Séries de Poincaré motiviques	1
2. Singularités quasi-ordinaires	3
3. Arcs et désingularisation plongée torique d'une hypersurface irréductible à singularité quasi-ordinaire	5
4. Définitions	7
5. Étude des troncations d'arcs ne se relevant pas en arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul	8
6. Calcul de $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ et $\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}$	10
6.1. Cas C1	11
6.2. Cas C2	12
6.3. Calcul de $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ et $\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}$	14
7. Étude de l'union (1)	15
8. Étude des troncations d'arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul	16
9. Résultat principal	17
10. Cas où les $a_i(1) \geq 1$ pour tout i	18
10.1. Exemples	21
Références	22

1. SÉRIES DE POINCARÉ MOTIVIQUES

Soit $(X, 0)$ un germe de variété analytique sur un corps $\mathbb{k}$ de caractéristique nulle. Soit p un entier naturel. Nous définissons l'espace des jets d'ordre p , noté X_p , comme étant la variété algébrique sur $\mathbb{k}$ dont les points $\mathbb{K}$ -rationnels, pour toute extension de corps $\mathbb{K}$ de $\mathbb{k}$, sont les $\mathbb{K}[t]/t^{p+1}$ -points de $(X, 0)$. C'est-à-dire que nous avons $X_p = \{\varphi : \text{Spec } \mathbb{K}[[t]]/t^{p+1} \longrightarrow (X, 0)\}$. Dans le cas particulier où $(X, 0)$ est un germe de variété analytique définie par les équations $f_i(x) = 0$, pour $i = 1, \dots, r$ et $x = (x_1, \dots, x_s)$, alors X_p est la variété affine définie par les équations en les variables $x_{j,k}$ pour $k = 1, \dots, p$ et $j = 1, \dots, s$, provenant du fait que $f_i(x_{j,1}t + \dots + x_{j,p}t^p) = 0 \bmod t^{p+1}$ pour tout i .

La limite projective de ces variétés, appelée espace des arcs sur X , est notée X_∞

et n'est en général pas de type fini sur $\mathbb{k}$.
 Nous avons les morphismes naturels de troncations

$$\pi_p : X_\infty \longrightarrow X_p \text{ et } \pi_{p,q} : X_p \longrightarrow X_q \text{ pour } p \geq q .$$

Nous nous intéressons ici au comportement des arcs tronqués, c'est-à-dire aux $\pi_p(X_\infty)$ quand p varie. Nous savons, d'après le théorème de Greenberg [Gr], que ce sont des ensembles constructibles. On peut donc considérer leur image dans l'anneau de Grothendieck $K_0(\text{Var}_{\mathbb{k}})$ des variétés sur $\mathbb{k}$ [DL1]. Plus précisément nous nous intéressons à la série de Poincaré géométrique $P_{\text{geom},X,0}(T) := \sum_{p \geq 0} [\pi_p(X_\infty)] T^p$ où $[Y]$ représente la classe de la variété Y dans $K_0(\text{Var}_{\mathbb{k}})$. Denef et Loeser ont montré que cette série était rationnelle avec un dénominateur qui s'écrit sous forme du produit de termes de la forme $1 - \mathbb{L}^a T^b$ où $\mathbb{L} := [\mathbb{A}_{\mathbb{k}}^1]$ et $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (cf. [DL1]). Cependant la preuve utilise à la fois la résolution des singularités de la variété et un théorème d'élimination des quantificateurs dû à Pas [Pa], et n'apporte aucune information quantitative, en particulier sur les pôles. Cette série a jusqu'à présent été calculée pour les branches planes (cf. [DL2]) et les singularités de surfaces toriques normales (cf. [LJ-R2] et [Nil]).

Par ailleurs, on peut aussi considérer φ_p , la formule dans le langage de premier ordre de $\mathbb{k}[[T]]$, dû à Pas [Pa], qui définit $\pi_p(X_\infty)$, qui est un ensemble constructible, et regarder sa mesure arithmétique $\chi_c(\varphi_p)$ dans l'anneau de Grothendieck $K_0^v(\text{Mot}_{\mathbb{k}, \overline{\mathbb{Q}}})_{\mathbb{Q}}$, c'est-à-dire l'anneau de Grothendieck des motifs de Chow sur $\mathbb{k}$ à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}$ tensorisé avec $\mathbb{Q}$ (cf. [DL2] ou [Ha] pour une introduction). Une autre série intéressante est alors la série définie par $\sum_{p \geq 0} \chi_c(\varphi_p) T^p$. Cette série se spécialise pour tout q premier, sauf un nombre fini, en la série $\sum_{p \geq 0} N_{q^p}(X, 0) T^p$, où $N_{q^p}(X, 0)$ est le cardinal des $\mathbb{Z}/q^p\mathbb{Z}$ -points de $(X, 0)$ qui se relèvent en des $\mathbb{Z}_q$ -points de $(X, 0)$. Denef et Loeser ont montré le même résultat de rationalité pour cette série que pour la série géométrique (cf. [DL2]). Cette série a été calculée pour les branches planes (cf. [DL2]) et les singularités de surfaces toriques normales (cf. [Nil]). Pour les branches planes ces deux séries diffèrent et pour les surfaces normales toriques, J. Nicaise montre l'égalité.

Nous avons effectué ici le calcul des séries géométrique et arithmétique d'un germe d'hypersurface irréductible quasi-ordinaire. Ce type de singularité généralise les singularités de courbes planes dans le sens où il existe une paramétrisation de ces singularités à l'aide de séries fractionnaires à plusieurs variables dont le dénominateur est borné. L'ensemble des exposants, apparaissant dans l'écriture de ces séries, appartient au groupe engendré par un nombre fini d'exposants, appelés *exposants caractéristiques*, qui généralisent les exposants caractéristiques d'une courbe plane. Pour calculer la mesure motivique de l'ensemble des arcs tronqués à l'ordre p , nous décomposons cet ensemble en deux ensembles constructibles : l'ensemble des arcs tronqués qui ne se relèvent pas en arcs inclus dans le complémentaire du tore et son complémentaire. Nous donnons d'abord une caractérisation combinatoire des arcs tronqués qui ne se relèvent pas en arcs inclus dans le complémentaire du tore. Cela nous permet de calculer la mesure motivique de l'ensemble de ces arcs tronqués. Enfin nous donnons une formule de récurrence sur la dimension du germe pour la mesure de son complémentaire. Nous obtenons alors des formules générales, inductives sur la dimension de l'hypersurface, de ces deux séries. Nous donnons enfin une

formule explicite de ces séries dans le cas où les coordonnées des exposants caractéristiques de la singularité sont supérieures à 1, c'est-à-dire quand la projection de celle-ci est "très" transverse (théorème 10.3).

Je tiens à remercier ici M. Lejeune-Jalabert pour avoir fait preuve de patience à l'écoute de ces résultats et pour ses précieux commentaires. Je remercie aussi J. Nicaise pour m'avoir, le premier, parlé des séries de Poincaré motivique lors du GAEL XII, et Helena Cobo Pablos et Pedro Gonzalez-Perez pour m'avoir indiqué une erreur dans la première version de ce travail.

2. SINGULARITÉS QUASI-ORDINAIRES

Nous rappelons ici la définition de singularité quasi-ordinaire et les propriétés de ces singularités dont nous aurons besoin.

Définition 2.1. (cf. [G-P1] par exemple) Soit $f \in \mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[Y]$ un polynôme distingué. On dit que f est quasi-ordinaire si son discriminant $\Delta_Y(f)$ a un terme dominant, c'est-à-dire si il s'écrit $X^\alpha u$ où $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^m$ et u est inversible. Géométriquement, cela revient à dire que le discriminant de la projection du germe $(X, 0) \subset \mathbb{C}^{m+1} \longrightarrow \mathbb{C}^m$ qui envoie le point de coordonnées $(x_1, \dots, x_m, y)$ sur le point de coordonnées $(x_1, \dots, x_m)$ est à croisements normaux.

Nous avons alors la proposition

Proposition 2.2. [Ab] *Les racines de f vu comme polynôme en Y sont dans*

$$\widetilde{\mathbb{C}\{X\}} = \lim_{\substack{\rightarrow \\ k \in \mathbb{N}^*}} \mathbb{C}\{X^{\frac{1}{k}}\}.$$

De plus les racines de f sont deux à deux comparables, c'est-à-dire que pour toutes ξ et ξ' racines de f , $\xi - \xi'$ s'écrit $X^\alpha u$ où $\alpha \in \mathbb{Q}_{\geq 0}^m$ et u est inversible.

Le semi-groupe $\mathbb{N}^{m+1}$ étant muni de l'ordre lexicographique $\leq_{lex}$, nous pouvons définir l'ordre suivant sur $\mathbb{N}^m$:

Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ et $(\beta_1, \dots, \beta_m) \in \mathbb{N}^m$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \leq (\beta_1, \dots, \beta_m)$ si et seulement si $(|\alpha|, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \leq_{lex} (|\beta|, \beta_1, \dots, \beta_m)$. Ainsi $\mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}$ est muni d'une valuation ν_X , à valeurs dans $\mathbb{N}^m$ muni de l'ordre défini précédemment, qui à un monôme X^α associe $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. La valuation ν_X s'étend alors à $\widetilde{\mathbb{C}\{X\}}$ (mais son groupe de valeurs est alors $\mathbb{Q}^m$).

Théorème 2.3. [Ga],[Li2] *Soit f irréductible et quasi-ordinaire. Alors nous avons :*

- (1) *Si $\deg_Y(f) = n$ alors f a n racines distinctes dans $\mathbb{C}\{X^{\frac{1}{n}}\}$.*
- (2) *Si ξ est une racine de f dans $\mathbb{C}\{X^{\frac{1}{n}}\}$, alors il existe des éléments de $(\frac{1}{n}\mathbb{Z})^m$, strictement ordonnés, $a(1) < \dots < a(g)$ (i.e. $a_k(1) \leq \dots \leq a_k(g)$ pour tout k et $a(i) \neq a(j)$ pour $i \neq j$) tels que l'on puisse écrire*

$$\xi = \xi_0 + \xi_1 + \dots + \xi_g$$

$$\text{avec } \xi_0 \in \mathbb{C}\{X\},$$

$$X^c \text{ apparaît dans } \xi \implies c \in \mathbb{Z}^m + \sum_{a(i) \leq c} a(i)\mathbb{Z},$$

$$X^c \text{ apparaît dans } \xi_i \implies c \in \mathbb{Z}^m + \sum_{j \leq i} a(j)\mathbb{Z},$$

$$\text{et } \nu_X(\xi_k) = a(k) \text{ pour tout } k.$$

- (3) Si ξ est racine de f dans $\mathbb{C}\{X^{\frac{1}{n}}\}$, alors l'ensemble des racines de f est l'ensemble formé des $\xi(w_1 X_1^{\frac{1}{n}}, \dots, w_m X_m^{\frac{1}{n}})$ où les w_k parcourent l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Remarque 1. Quitte à faire le changement de variables

$$X_k \longmapsto X_k, \forall k$$

$$\text{et } Y \longmapsto Y + \xi_0$$

nous pouvons supposer que $\xi_0 = 0$ dans le théorème précédent.

Définition 2.4. Les $a(k)$ du lemme précédent sont appelés les exposants caractéristiques de f .

Nous pouvons aussi définir l'ensemble des exposants caractéristiques comme étant l'ensemble

$$\{\nu_X(\xi - \xi'), f(\xi) = f(\xi') = 0, \xi \neq \xi'\}.$$

Nous pouvons définir les réseaux $M = M_0 := \mathbb{Z}^m$ et $M_k := \mathbb{Z}^m + \sum_{l \leq k} a(l)\mathbb{Z}^m$ pour $1 \leq k \leq g$ et les réseaux duaux $N_i := \check{M}_i$ et $N = N_0$. Nous définissons les entiers caractéristiques n_k du germe d'hypersurface comme étant les indices des M_{k-1} dans M_k :

$$n_k = [M_k : M_{k-1}].$$

Nous posons aussi $n_0 = 1$ et $n_{-1} = 0$. Nous notons

$$e_{k-1} = n_k \dots n_g \text{ pour } k = 1, \dots, g.$$

Notons $L = L_0$ le corps des fractions de $\mathbb{C}\{X\}$. Nous pouvons remarquer que pour $k = 1, \dots, g$,

$$\begin{aligned} e_k &= [L[\xi] : L[X^{a(1)}, \dots, X^{a(k)}]] = [L[\xi] : L[\xi_1 + \dots + \xi_k]] \\ \text{et } n_k &= [L[X^{a(1)}, \dots, X^{a_k}] : L[X^{a(1)}, \dots, X^{a(k-1)}]] \\ &= [L[\xi_1 + \dots + \xi_k] : L[\xi_1 + \dots + \xi_{k-1}]]. \end{aligned}$$

En particulier nous avons $e_0 = n = n_1 \dots n_g$.

Nous pouvons aussi définir les vecteurs $\gamma(k)$ par :

$$\gamma(1) := a(1)$$

$$\gamma(k+1) := n_k \gamma(k) + a(k+1) - a(k)$$

Dans le cas $m = 1$, ce sont les $n\gamma_i$ sont des générateurs du semi-groupe de l'ensemble des multiplicités d'intersection $(C, X)_0$ où C parcourt l'ensemble des germes en 0 de courbes planes non contenues dans X (cf. [Z]).

Nous avons le

Lemme 2.5. [G-P2] *Le sous-réseau de M_g engendré par $\gamma(1), \dots, \gamma(k)$ est égal à M_k et l'ordre de $\gamma(k)$ dans le groupe M_k/M_{k-1} vaut n_k pour tout k .*

Enfin, pour tout i compris entre 1 et m notons k_i le plus petit entier qui vérifie $a_i(k_i) \neq 0$. Quitte à effectuer une permutation des variables X_i , nous pouvons supposer que nous avons

$$1 = k_1 = k_2 = \dots = k_{i_0} < k_{i_0+1} \leq k_{i_0+2} \leq \dots \leq k_m \leq g$$

3. ARCS ET DÉSINGULARISATION PLONGÉE TORIQUE D'UNE HYPERSURFACE IRRÉDUCTIBLE À SINGULARITÉ QUASI-ORDINAIRE

Soit $\varphi(t) := (x_1(t), \dots, x_m(t), y(t))$ un arc tracé sur un germe $(X, 0)$ d'hypersurface irréductible à singularité quasi-ordinaire d'exposants caractéristiques $a(1), \dots, a(g)$ définie par un polynôme de Weierstrass $f \in \mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[Y]$. Alors $f(x_1(t), \dots, x_m(t), y(t)) = 0$, donc $y(t) = \xi(x^{1/n}(t))$ où $\xi = \xi_1 + \dots + \xi_g$ est une racine de f (avec les notations du théorème 2.3) et les $x_i^{1/n}(t)$ sont des racines n -ièmes de $x_i(t)$ dans $\mathbb{C}[[t^{1/n}]]$. Nous noterons souvent ξ au lieu de $\xi(x^{1/n}(t))$ quand les racines n -ièmes de $x_i(t)$ seront fixées.

Remarque 2. Soit $X^a = X_1^{a_1} \dots X_m^{a_m}$ un monôme de $\mathbb{C}[X_1^{1/n}, \dots, X_m^{1/n}]$. Considérons m séries $x_i(t) = \sum_k x_{i,k} t^k$ de $\mathbb{C}[[t]]$, et notons $l_i = \text{ord}(x_i(t))$. Le choix d'une racine n -ième de $x_i(t)$ dans $\mathbb{C}[[t^{1/n}]]$ dépend uniquement du choix d'une racine n -ième de x_{i,l_i} dans $\mathbb{C}$. Pour tout i fixons une racine n -ième de x_{i,l_i} et notons la $x_{i,l_i}^{1/n}$. Nous noterons alors sans équivoque $x_{i,l_i}^{a_i} = (x_{i,l_i}^{1/n})^{na_i}$. Dans ce cas nous avons

$$\begin{aligned} x_i(t)^{a_i} &= x_{i,l_i}^{a_i} t^{a_i l_i} \left(1 + \sum_{k \geq l_i+1} \frac{x_{i,k}}{x_{i,l_i}} t^{k-l_i} \right)^{a_i} = x_{i,l_i}^{a_i} t^{a_i l_i} \left(1 + \sum_{k \geq 1} \frac{x_{i,k+l_i}}{x_{i,l_i}} t^k \right)^{a_i} \\ &= x_{i,l_i}^{a_i} t^{a_i l_i} \left(1 + a_i \sum_{k \geq 1} \frac{x_{i,k+l_i}}{x_{i,l_i}} t^k + \dots + \binom{a_i}{j} \left(\sum_{k \geq 1} \frac{x_{i,k+l_i}}{x_{i,l_i}} t^k \right)^j + \dots \right) \end{aligned}$$

avec $\binom{a_i}{j} := \frac{a_i(a_i-1)\dots(a_i-j+1)}{j!}$. Nous voyons que $x_1^{a_1}(t) \dots x_m^{a_m}(t)$ est dans $\mathbb{C}[[t]]$ si et seulement si $\sum_i a_i l_i \in \mathbb{N}$. Si tel est le cas, pour tout $c \in \mathbb{N}$ avec $c > \sum_i a_i l_i$, le coefficient de t^c dans l'expression de la série $x_1^{a_1}(t) \dots x_m^{a_m}(t)$ est un polynôme de la forme suivante :

$$\prod_{i=1}^m x_{i,l_i}^{a_i} P \left(x_{i,k}/x_{i,l_i}; l_i + 1 \leq k \leq c - \sum_j a_j l_j + l_i \text{ et } 1 \leq i \leq m \right)$$

où P est un polynôme quasi-homogène de poids $c - \sum_j a_j l_j$ et où $x_{i,k}/x_{i,l_i}$ est de poids $k - l_i$.

Notons $b_k : \mathbb{Z}^m \longrightarrow \mathbb{Q}$ la forme linéaire

$$b_k(\underline{l}) := \sum_{i=1}^m a_i(k) l_i, \quad \forall k \in \{0, \dots, g\}$$

et M l'application linéaire

$$\begin{aligned} M : \mathbb{Z}^m &\longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^g \\ (l_1, \dots, l_m) &\longmapsto (n \sum a_i(1) l_i, \dots, n \sum a_i(g) l_i) \end{aligned}$$

Si l_i est l'ordre de $x_i(t)$, alors d'après le théorème 2.3, nous voyons que nécessairement $b_1(\underline{l}) \in \mathbb{N}$ et donc $\xi_1(x^{1/n}(t)) \in \mathbb{C}[[t]]$. En retranchant $\xi_1(x^{1/n}(t))$ à $y(t)$, nous voyons alors que $b_2(\underline{l}) \in \mathbb{N}$ et donc que $\xi_2(x^{1/n}(t)) \in \mathbb{C}[[t]]$. Par induction nous voyons que

$$(\text{ord}(x_1(t)), \dots, \text{ord}(x_m(t))) \in \text{Ker } M.$$

Inversement, si l'on se fixe m séries formelles en t , notées $x_i(t)$ pour $1 \leq i \leq m$, qui vérifient $(\text{ord}(x_1(t)), \dots, \text{ord}(x_m(t))) \in \text{Ker } M \cap (\mathbb{N}^*)^m$, alors pour toute solution ξ de f , nous avons $\xi(x^{1/n}(t)) \in \mathbb{C}[[t]]$, et $(x_1(t), \dots, x_m(t), \xi(x^{1/n}(t)))$ définit un arc tracé sur $(X, 0)$.

Nous allons maintenant relier $\text{Ker } M$ aux réseaux apparaissant dans une résolution plongée torique de $(X, 0)$. Nous rappelons ici la construction de la résolution plongée torique construite par P. Gonzalez Perez [G-P2]. Dans la suite, nous noterons Z_Σ la variété torique d'éventail Σ .

Soit $R = \mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[Y]/(f)$ l'anneau des fonctions de $(X, 0)$. L'anneau R est une $\mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}$ -algèbre de finie. Nous avons alors un morphisme fini $\pi : (X, 0) \longrightarrow (\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^m, 0)$ dont le lieu de ramification est inclus dans le germe à croisements normaux défini par $X_1 \dots X_m = 0$ (non-ramifié au-dessus du tore). Notons σ l'éventail de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^m$ gal à $\mathbb{R}_{\geq 0}^m$ et Δ l'éventail $\sigma \oplus \mathbb{R}_{\geq 0}^g = \mathbb{R}_{\geq 0}^{m+d} \subset (N_\Delta)_{\mathbb{R}}$ où N_Δ est le réseau $N \oplus \mathbb{Z}^g$. Soit $u_1, \dots, u_g$ la base canonique de $\{0\} \oplus \mathbb{Z}^g$. Les éléments de $\check{\Delta} \cap M_\Delta$ sont de la forme (v, w) où $v \in \check{\sigma} \cap M$ et $w = w_1 u_1^* + \dots + w_g u_g^*$ avec $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Nous allons considérer le plongement $(X, 0) \subset (Z_\Delta, o_\Delta)$, où o_Δ est l'orbite de dimension 0 de la variété torique Z_Δ , défini par le morphisme de $\mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}$ -algèbres :

$$\Psi : \mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[U_1, \dots, U_{g-1}] \longrightarrow R$$

qui à U_j associe $q_{j-1}(\xi)$ où $(q_0, q_1, \dots, q_{g-1})$ est un système de racines approchées de f (c'est-à-dire que q_j est polynôme quasi-ordinaire minimal de $\mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[Y]$ associé à la branche $\xi_1 + \dots + \xi_j$; en particulier $q_0 = Y$). Nous pouvons remarquer que $\Psi(U_1) = \xi$.

Soit

$$\begin{aligned} \varphi & : M_\Delta & \longrightarrow & M_g \\ & (v, w) & \longmapsto & v + \sum_{k=1}^g w_k \gamma(k) \end{aligned}$$

Soit $L \subset (N_\Delta)_{\mathbb{R}}$ l'espace linéaire défini comme étant l'orthogonal de $\text{Ker}(\varphi)$ et soit Ξ le cône $\Delta \cap L$. Nous appellerons *squelette* de la singularité le cône Ξ (selon la définition de [LJ-R1]).

Donnons tout d'abord la définition de résolution partielle :

Définition 3.1. Soit X une variété plongée dans Z_{Σ_1} une variété torique d'éventail Σ_1 . Soit Σ_2 une subdivision de Σ_1 . On dit que le morphisme torique $\varphi_{2,1} : Z_{\Sigma_2} \longrightarrow Z_{\Sigma_1}$ est une résolution plongée partielle de X si pour toute division régulière Σ_3 de Σ_2 contenant tous les cônes réguliers de Σ_2 , le morphisme torique induit $\varphi_{3,2} : Z_{\Sigma_3} \longrightarrow Z_{\Sigma_2}$ composé avec $\varphi_{2,1}$ est une résolution plongée de X .

Nous avons alors le

Théorème 3.2. [G-P2] *Soit Σ une division de Δ contenant Ξ . Alors le morphisme $\pi_\Sigma : Z_\Sigma \longrightarrow Z_\Delta$ est une résolution plongée partielle du germe $(X, 0) \subset (Z_\Delta, o_\Delta)$.*

Nous pouvons alors donner une description de $\text{Ker } M$. Tout d'abord nous appellerons *vecteur caractéristique* de h (où h est un arc de $(\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^m, 0)$ défini par $(x_1(t), \dots, x_m(t))$) le vecteur $(x_1(t), \dots, x_m(t), q_0(\xi), \dots, q_g(\xi))$.

Proposition 3.3. *Le squelette Ξ correspond exactement à l'ensemble des vecteurs caractéristiques. En particulier le sous-réseau $\text{Ker } M \subset N$ est inclu dans la projection de Ξ sur N .*

Démonstration. L'application linéaire φ est définie par la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \gamma_1(1) & \cdots & \gamma_1(g) \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \gamma_m(1) & \cdots & \gamma_m(g) \end{pmatrix}$$

Le noyau de φ est donc l'image de l'application linéaire de N_g dans N_{Δ} définie par la transposée de cette matrice. Or $N_g = \text{Ker } M$. Donc Ξ est exactement l'ensemble des éléments de la forme $(\underline{l}, \underline{p})$ avec $\underline{l} \in \text{Ker } M$ et $p_k = \sum_i \gamma_i(k) l_i$ pour $1 \leq k \leq g$. Or, pour tout vecteur caractéristique $(x_1(t), \dots, x_m(t), q_0(\xi), \dots, q_g(\xi))$, nous avons $\text{ord}(q_k(\xi)) = \sum_i \gamma_i(k) \text{ord}(x_i(t))$. Donc Ξ correspond exactement à l'ensemble des vecteurs caractéristiques. $\square$

4. DÉFINITIONS

Nous allons étudier ici les séries de Poincaré géométrique et arithmétique :

$$P_{\text{geom}, X(a(1), \dots, a(g)), 0}(T) := \sum_{p \geq 0} [\pi_p(X(a(1), \dots, a(g))_{\infty})] T^p,$$

$$P_{\text{arit}, X(a(1), \dots, a(g)), 0}(T) := \sum_{p \geq 0} \chi_c(\varphi_p) T^p$$

où $(X(a(1), \dots, a(g)), 0)$ est un germe d'hypersurface irréductible, mais non nécessairement réduit, défini par f quasi-ordinaire. L'espace des arcs tracés sur le germe d'hypersurface défini par f et celui des arcs tracés sur le germe d'hypersurface réduit associé sont les mêmes. Les espaces d'arcs tronqués sont donc aussi les mêmes. Nous pouvons donc supposer que le germe considéré est réduit. Supposons que f est un polynôme de Weierstrass de $\mathbb{C}\{X_1, \dots, X_m\}[Y]$ de degré n .

Notons

$$\chi_{p, l_1, \dots, l_m} := \pi_p(X(a(1), \dots, a(g))_{\infty}) \cap \{(x_1(t), \dots, x_m(t), y(t)) / \text{ord}(x_i) = l_i\}$$

et

$$\varphi_{p, l_1, \dots, l_m} := \varphi_p \wedge (\text{ord}(x_i) = l_i)$$

avec $\varphi_p = \varphi_p(a(1), \dots, a(m))$ la formule

$$\exists z_1(t), \dots, z_m(t) ((\text{ord}(x_i - z_i) > p) \wedge (\text{ord}(y - h(z)) > p)) .$$

Nous noterons $X(a(1), \dots, a(g))_{p, cn}$ le sous-ensemble constructible de l'ensemble constructible $\pi_p(X(a(1), \dots, a(g))_{\infty})$ qui correspond à la troncation d'arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul et nous noterons $X(a(1), \dots, a(g))_{p, to}$ le sous-ensemble de $\pi_p(X(a(1), \dots, a(g))_{\infty})$ qui correspond à la troncation d'arcs qui ne peuvent

pas se relever en arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul. De même nous noterons $\varphi_{p,cn}(a(1), \dots, a(m))$ la formule

$$\exists z_1(t), \dots, z_m(t) ((\text{ord}(x_i - z_i) > p) \wedge (\text{ord}(y - h(z)) > p) \wedge (\exists i / z_i(t) = 0))$$

et $\varphi_{p,to}(a(1), \dots, a(m))$ la formule

$$(\exists z_1(t), \dots, z_m(t) ((\text{ord}(x_i - z_i) > p) \wedge (\text{ord}(y - h(z)) > p)))$$

$$\wedge (\neg \exists z_1(t), \dots, z_m(t) ((\text{ord}(x_i - z_i) > p) \wedge (\text{ord}(y - h(z)) > p) \wedge (\exists i / z_i(t) = 0)))$$

Nous avons évidemment

$$[\pi_p(X(a(1), \dots, a(g))_\infty)] = [X(a(1), \dots, a(g))_{p,cn}] + [X(a(1), \dots, a(g))_{p,to}]$$

$$\text{et } \chi_c(\varphi_p(a(1), \dots, a(m))) = \chi_c(\varphi_{p,to}(a(1), \dots, a(m))) + \chi_c(\varphi_{p,cn}(a(1), \dots, a(m))) .$$

Notons aussi

$$P_{geom}^{tore^c}(a(1), \dots, a(m))(T) := \sum_{p \geq 0} [X(a(1), \dots, a(g))_{p,cn}] T^p ,$$

$$P_{geom}^{tore}(a(1), \dots, a(m))(T) := \sum_{p \geq 0} [X(a(1), \dots, a(g))_{p,to}] T^p ,$$

$$P_{arit}^{tore^c}(a(1), \dots, a(m))(T) := \sum_{p \geq 0} \chi_c(\varphi_{p,cn}(a(1), \dots, a(m))) T^p ,$$

$$\text{et } P_{arit}^{tore}(a(1), \dots, a(m))(T) := \sum_{p \geq 0} \chi_c(\varphi_{p,to}(a(1), \dots, a(m))) T^p .$$

Remarque 3. Si pour tout i nous avons $l_i < +\infty$, alors $[\chi_{p,l_1,\dots,l_m}] = 0$ si et seulement si $\underline{l} \notin \text{Ker } M$ (et de même $\chi_c(\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}) = 0$ si et seulement si $\underline{l} \notin \text{Ker } M$).

5. ÉTUDE DES TRONCATIONS D'ARCS NE SE RELEVANT PAS EN ARCS POUR LESQUELS UN DES $x_i(t)$ EST NUL

Le terme $[X(a(1), \dots, a(g))_{p,to}]$ correspond aux arcs tronqués qui ne peuvent pas se relever en arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul. Si $(x_1(t), \dots, x_m(t), y(t))$ est un arc dont la p -troncation ne peut pas se relever en un arc pour lequel un des $x_i(t)$ est nul, nous notons $l_i = \text{ord}(x_i(t))$. Nous avons alors la proposition suivante :

Proposition 5.1. *Soit $h(t) := (x_1(t), \dots, x_m(t), y(t))$ un arc de $(X, 0)$. Alors la p -troncation de h ne peut pas se relever en un arc pour lequel un des $x_i(t)$ est nul, si et seulement si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :*

C1) *Soit $l_i \leq p$ pour tout i .*

C2) *Soit il existe i tel que $+\infty > l_i \geq p + 1$, et*

$$- p - l_j \geq b_{k_i}(\underline{l}) - b_{k_j}(\underline{l}) \text{ pour tout } j \text{ tel que } k_j < k_i,$$

$$- b_{k_i}(\underline{l}) \leq p.$$

Remarque 4. En particulier, si $k_i \neq k_j$, alors l_i et l_j ne peuvent être supérieurs strictement à p en même temps. En effet, supposons $l_i > p$ et $l_j > p$ avec $i \neq j$ et $k_i > k_j$. Alors nous avons selon la seconde condition : $p - l_j \geq b_{k_i}(\underline{l}) - b_{k_j}(\underline{l}) > 0$, ce qui est contradictoire. Si il existe i tel que $l_i > p$, nous noterons $r_{\underline{l}}$ l'entier k_i .

Démonstration. Montrons tout d'abord qu'un arc tronqué qui ne peut pas se relever en arc pour lequel un des $x_i(t)$ est nul vérifie nécessairement l'une des deux conditions. Tout d'abord, si $l_i \geq p+1$ et si $b_{k_i}(\mathbb{L}) \geq p+1$, alors on peut relever cet arc tronqué en un arc pour lequel $x_i(t) = 0$, en considérant un relevé quelconque h de cet arc tronqué, et en choisissant l'arc h' dont toutes les coordonnées, sauf la i -ième, sont égales à celles de h , et la i -ème est nulle.

Maintenant supposons que $l_i \geq p+1$ et que $p-l_j < b_{k_i}(\mathbb{L}) - b_{k_j}(\mathbb{L})$ pour un j tel que $k_j < k_i$. En particulier, d'après la remarque 4, pour j tel que $k_j \neq k_i$, $l_j \leq p$ et donc les $x_{j,k}$ sont fixés pour $k \leq p$ car les $x_j(t)$ sont fixés modulo t^{p+1} . Considérons alors le coefficient de $t^{b_{k_i}(\mathbb{L})}$ dans l'écriture de $\xi_{k_j}(x^{1/n})$ et dans l'écriture de $\xi_{k_i}(x^{1/n})$. Dans $\xi_{k_j}(x^{1/n})$, celui-ci est de la forme

$$\prod_{r \neq j} x_{r,l_r}^{a_r(k_j)} \cdot \left(\frac{x_{j,b_{k_i}(\mathbb{L})-b_{k_j}(\mathbb{L})+l_j}}{x_{j,l_j}} + P \left(\frac{x_{r,k}}{x_{r,l_r}}; k \leq b_{k_i}(\mathbb{L}) - b_{k_j}(\mathbb{L}) + l_r \text{ et } 1 \leq r \leq m \right) \right)$$

où P ne dépend pas de $\frac{x_{j,b_{k_i}(\mathbb{L})-b_{k_j}(\mathbb{L})+l_j}}{x_{j,l_j}}$. Comme $b_{k_i}(\mathbb{L}) - b_{k_j}(\mathbb{L}) + l_j > p$, le terme $\frac{x_{j,b_{k_i}(\mathbb{L})-b_{k_j}(\mathbb{L})+l_j}}{x_{j,l_j}}$ n'apparaît pas dans l'écriture de $x_j(t)$ modulo t^{p+1} . Il n'apparaît pas non plus dans l'expression des coefficients de t^d , pour $d < b_{k_i}(\mathbb{L})$, dans l'écriture de $\xi(x^{1/n})$. D'autre part, le coefficient de $t^{b_{k_i}(\mathbb{L})}$ dans l'écriture de $\xi_{k_i}(x^{1/n})$ est de la forme :

$$\prod_{r \neq i} x_{r,l_r}^{a_r(k_i)} \cdot x_{i,l_i}^{a_i(k_i)}$$

En particulier, nous pouvons choisir x_{i,l_i} égal à zéro en donnant la bonne valeur au terme $\frac{x_{j,b_{k_i}(\mathbb{L})-b_{k_j}(\mathbb{L})+l_j}}{x_{j,l_j}}$. Ceci n'affecte alors ni la valeur de $x_j(t)$ modulo t^{p+1} , ni la valeur des coefficients de t^d , pour $d < b_{k_i}(\mathbb{L})$, dans l'écriture de $\xi(x^{1/n})$. Nous pouvons continuer ainsi par récurrence croissante sur c en regardant le coefficient de t^c dans l'écriture de $\xi(x^{1/n})$ et annuler le terme $x_{i,c-\sum_{r \neq i} a_r(k_i)l_r}$ en modifiant éventuellement le terme $\frac{x_{j,c-b_{k_j}(\mathbb{L})+l_j}}{x_{j,l_j}}$.

Montrons maintenant la suffisance de ces deux conditions. La première condition implique clairement que l'arc tronqué ne peut pas se relever en un arc dont l'une des coordonnées est nulle. Montrons que la seconde est aussi suffisante.

Soit h un arc qui vérifie la seconde condition. Tout d'abord, comme $l_j \leq p$ pour j tel que $k_j \neq k_i$, les coordonnées $x_j(t)$ d'un relèvement d'une p -troncation de h sont non nulles. Plus particulièrement, pour j tel que $k_j \neq k_i$, $x_{j,k}$ est fixé pour $l_j \leq k \leq p$. Le coefficient de $t^{b_1(\mathbb{L})}$ fixe $\prod_j x_{j,l_j}^{a_j(1)}$. Par récurrence croissante sur les coefficients de t^c , pour $c < b_{k_i}(\mathbb{L})$, $\prod_j x_{j,l_j}^{a_j(r)}$ est fixé pour $r < k_i$ car seuls les $x_{j,k}$ pour $j \neq i$ et $k \leq c - b_{k_j}(\mathbb{L}) + l_j < p$ apparaissent dans son expression. Considérons alors le coefficient de $t^{b_{k_i}(\mathbb{L})}$ dans l'expression de la coordonnée $y(t)$ de h . Nous avons $y(t) = \xi_1(x^{1/n}(t)) + \dots + \xi_{k_i}(x^{1/n}(t)) + \dots + \xi_g(x^{1/n}(t))$ pour un choix d'une racine n -ième des $x_j(t)$. Le coefficient de $t^{b_{k_i}(\mathbb{L})}$ dans l'expression de $\xi_r(x^{1/n}(t))$ est de la forme (pour $r < k_i$) :

$$\prod_{j \neq i} x_{j,l_j}^{a_j(r)} P_r(x_{j,k}/x_{j,l_j}, k \leq b_{k_i}(\mathbb{L}) - b_{k_r}(\mathbb{L}) + l_j)$$

d'après la remarque 2. Or nous avons $p - l_j \geq b_{k_i}(\underline{L}) - b_{k_j}(\underline{L}) \geq b_r(\underline{L}) - b_{k_j}(\underline{L})$, et donc $P_r(x_{j,k}/x_{j,l_j}, k \leq b_{k_i}(\underline{L}) - b_{k_r}(\underline{L}) + l_j)$ est fixé du fait que les $x_j(t)$ sont fixés modulo t^{p+1} . D'après la récurrence, le coefficient considéré est donc fixé. Le coefficient de $t^{b_{k_i}(\underline{L})}$ dans l'expression de $\xi_{k_i}(x^{1/n}(t))$ est de la forme :

$$\prod_{j \neq i} x_{j,l_j}^{a_j(k_i)} \cdot x_{i,l_i}^{a_i(k_i)}$$

Donc le coefficient de $t^{b_{k_i}(\underline{L})}$ dans l'expression de $y(t)$ est de la forme $ax_{i,l_i}^{a_i(k_i)} + b$ où b est fixé et a est non nul par hypothèse sur h . Comme $x_{i,l_i} \neq 0$ par hypothèse sur h , $b \neq 0$ et nécessairement tout relevé de la p -truncation de h a sa i -ième coordonnée non nulle. Plus précisément, nous pouvons remarquer que nécessairement $b_{k_i}(\underline{L}) = \sum_j a_j(k_i)l_j$ est fixé. $\square$

Nous avons donc

$$(1) \quad X(a(1), \dots, a(g))_{p,to} = \bigcup_{(l_1, \dots, l_m) \in D(m)_p} \chi_{p, l_1, \dots, l_m}$$

où

$$\begin{aligned} \Sigma_{m,p} &:= \{(l_1, \dots, l_m) / l_i \leq p\} \bigcup \\ &\left(\bigcup_{i=1}^m \{(l_1, \dots, l_m) / l_i > p, p - l_j \geq b_{k_i}(\underline{L}) - b_{k_j}(\underline{L}), k_j < k_i, b_{k_i}(\underline{L}) \leq p\} \right) \\ \text{et } D(m)_p &:= \Sigma_{m,p} \cap \text{Ker } M \cap (\mathbb{N}^*)^m. \end{aligned}$$

Il nous suffit donc de calculer $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$ et $\varphi_{p, l_1, \dots, l_m}$, et d'étudier l'union (1).

6. CALCUL DE $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$ ET $\varphi_{p, l_1, \dots, l_m}$

Pour calculer $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$ et $\varphi_{p, l_1, \dots, l_m}$, nous allons voir que $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$ peut s'écrire sous la forme $\overline{\chi}_{p, l_1, \dots, l_m} \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{n(p, \underline{L})}$, où $n(p, \underline{L})$ est un entier, et nous allons trouver un revêtement galoisien $W \rightarrow \overline{\chi}_{p, l_1, \dots, l_m}$ surjectif où $[W]$ est facile à calculer et l'action du groupe de Galois du revêtement est facile à décrire.

Pour cela, notons $x_j = \sum_{r \geq l_j} x_{j,r} t^r$ et $z_j = z_{j,0} t^{\frac{l_j}{n}} (1 + \sum_{r \geq 1} z_{j,r} t^r)$. Les termes $z_{j,r}$ pour $r > p - l_j$ n'apparaissent pas dans l'expression de z_j^n modulo t^{p+1} mais $z_{j,p-l_j}$ y apparait. De même les termes $z_{j,r}$ pour $r > p - b_{k_j}(\underline{L})$ n'apparaissent pas dans l'expression de $\xi(z)$ modulo t^{p+1} si $p \geq b_{k_j}(\underline{L})$ mais $z_{j,p-b_{k_j}(\underline{L})}$ y apparait. Si $p < b_{k_j}(\underline{L})$, alors aucun terme $z_{j,r}$ n'apparait dans l'expression de $\xi(z)$ modulo t^{p+1} . Soit

$$W_{\underline{L}} := \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^m \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{\max\{p-l_1, p-b_{k_1}(\underline{L})\}} \times \dots \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{\max\{p-l_m, p-b_{k_m}(\underline{L})\}}.$$

On considère sur $W_{\underline{L}}$ les coordonnées $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0})$ sur le premier facteur et les coordonnées $(z_{j,1}, \dots, z_{j, \max\{p-l_j, p-b_{k_j}(\underline{L})\}})$ sur le $(j+1)$ -ième facteur.

Soit V la variété $\mathbb{A}^{p(m+1)}$; considérons le morphisme de $\mathbb{C}$ -schémas $h_{\underline{L}} : W_{\underline{L}} \rightarrow V$ qui envoie le point de coordonnées précédentes sur les p premiers coefficients de $z_1^n, \dots, z_m^n$ et $\xi(z)$ (où $z_j(t) := z_{j,0} t^{\frac{l_j}{n}} (1 + \sum_{r=1}^{\max\{p-l_j, p-b_{k_j}(\underline{L})\}} z_{j,r} t^r)$) :

$$h_{\underline{L}} : W_{\underline{L}} \rightarrow V$$

$$z_i = z_{i,0} t^{\frac{l_i}{n}} \left(1 + \sum_{j=1}^{\max(p-l_i, p-b_{k_i}(\underline{l}))} z_{i,j} t^j \right) \mapsto z_1^n, \dots, z_m^n, \xi(z)$$

L'image de $h_{\underline{l}}$ coïncide clairement avec $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$, mais ce morphisme n'est pas fini en général.

Nous allons noter (si $I_{p, \underline{l}}$ est l'ensemble des indices j pour lesquels $l_j > p$)

$$D_{0,i}(m)_p := \{ \underline{l} \in D(m)_p \setminus l_j \leq p \ \forall j, \ l_i - b_{k_i}(\underline{l}) \geq l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j \neq i \\ \text{et } l_i - b_{k_i}(\underline{l}) > l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j < i \}$$

et

$$D_{q,i}(m)_p := \{ \underline{l} \in D(m)_p \setminus l_i > p, \ \text{Card}(I_{p, \underline{l}}) = q, \ l_i - b_{k_i}(\underline{l}) \geq l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j \neq i \\ \text{et } l_i - b_{k_i}(\underline{l}) > l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j < i \}.$$

Remarque 5. Si $l_i > p$ et si j est tel que $k_j \neq k_i$, alors $l_i - b_{k_i}(\underline{l}) > l_j - b_{k_j}(\underline{l})$. En effet, si $k_i > k_j$, alors par hypothèse nous avons $p - l_j \geq b_{k_i}(\underline{l}) - b_{k_j}(\underline{l})$. Or $p - l_j < l_i - l_j$ et le résultat s'ensuit. Si $k_i < k_j$, alors $0 < l_i - p \leq l_i - l_j$. Or $b_{k_i}(\underline{l}) - b_{k_j}(\underline{l}) < 0$ et le résultat s'ensuit là encore. En particulier nous avons

$$D(m)_p = \coprod_{0 \leq i, q \leq m} D_{i,q}(m)_p.$$

6.1. Cas C1. Soit $\underline{l} \in D_{0,i}(m)_p$. Nous notons alors

$$W'_{\underline{l}} := \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^m \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_1} \times \dots \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{\max\{p-l_i, p-b_{k_i}(\underline{l})\}} \times \dots \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_m}$$

et

$$W''_{\underline{l}} := \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^m \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_1} \times \dots \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_m}.$$

On considère sur $W'_{\underline{l}}$ les coordonnées $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0})$ sur le premier facteur, les coordonnées $(z_{j,1}, \dots, z_{j,p-l_j})$ sur le $(j+1)$ -ième facteur pour $j \neq i$ et les coordonnées $(z_{i,1}, \dots, z_{i, \max\{p-l_i, p-b_{k_i}(\underline{l})\}})$ sur $(i+1)$ -ième facteur. On considère sur $W''_{\underline{l}}$ les coordonnées $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0})$ sur le premier facteur, et les coordonnées $(z_{j,1}, \dots, z_{j,p-l_j})$ sur le $(j+1)$ -ième facteur pour tout j .

Nous avons clairement

$$W''_{\underline{l}} \subset W'_{\underline{l}} \subset W_{\underline{l}}.$$

Nous notons

$$e := \max_j \{l_j - b_{k_j}(\underline{l}), 0\} = \max\{l_i - b_{k_i}(\underline{l}), 0\}.$$

Par ailleurs, nous notons $k_{\underline{l}}$ l'unique entier qui vérifie les inégalités suivantes :

$$(2) \quad b_{k_{\underline{l}}}(\underline{l}) = \sum_j a_j(k_{\underline{l}})l_j \leq p - e < \sum_j a_j(k_{\underline{l}} + 1)l_j = b_{k_{\underline{l}}+1}(\underline{l}).$$

Nous avons alors le résultat suivant :

Lemme 6.1. *Le morphisme $h_{\underline{l}}$ restreint à $W'_{\underline{l}}$ est fini et d'image $\chi_{p, l_1, \dots, l_m}$. Si nous notons $\overline{\chi}_{p, l_1, \dots, l_m} := h_{\underline{l}}(W''_{\underline{l}})$, nous avons $\chi_{p, l_1, \dots, l_m} = \overline{\chi}_{p, l_1, \dots, l_m} \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{l_i - b_{k_i}(\underline{l})}$ et $h_{\underline{l}}$ restreint à $W''_{\underline{l}}$ est un revêtement galoisien de $\overline{\chi}_{p, l_1, \dots, l_m}$. Son groupe de Galois est le groupe $G_{k_{\underline{l}}}$, sous-groupe commutatif de $\mathbb{U}_n^m$ formé des éléments $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ qui vérifient les équations $\prod_i \varepsilon_i^{n a_r(i)} = 1$ pour $r = 1, \dots, k_{\underline{l}}$ où $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n -ièmes de l'unité, qui agit par multiplication terme à terme sur $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^m$.*

Démonstration. Nous allons d'abord montrer que l'image de $W'_\underline{l}$ par $h_\underline{l}$ est égale à $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$.

Soit $z = (z_1, \dots, z_m) \in W_\underline{l}$, et montrons que l'on peut trouver $w \in W'_\underline{l}$ ayant même image par $h_\underline{l}$ que z . Nécessairement nous devons avoir

$$z_{j,0}^n = w_{j,0}^n \text{ si } l_j \leq p,$$

$$\left(1 + \sum_{k=1}^{p-l_j} z_{j,k} t^k\right)^n = \left(1 + \sum_{k=1}^{p-l_j} w_{j,k} t^k\right)^n \pmod{t^{p-l_j+1}} \text{ si } l_j \leq p.$$

Comme $l_j \leq p$ pour tout j , nécessairement $z_{j,0}^n = w_{j,0}^n$ et $z_{j,k} = w_{j,k}$, pour tout j et $1 \leq k \leq p-l_j$. Nous posons alors $w_{j,k} = z_{j,k}$, pour tout j et $0 \leq k \leq p-l_j$. Les coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$, pour $c \leq p-e$, ne dépendent que des $z_{j,k}$ pour $k \leq p-l_j$. Le coefficient de t^{p-e+1} est de la forme

$$\prod_j z_{j,l_j}^{a_j(k_j)} \cdot z_{i,p-l_i+1} + P$$

où P ne dépend que des $z_{i,k}$ pour $k \leq p-l_i$ et des $z_{j,k}$ pour $j \neq i$ et $k \leq p-l_j+1$. Comme $\prod_j z_{j,l_j}^{a_j(k_j)} = \prod_j w_{j,l_j}^{a_j(k_j)} \neq 0$, nous pouvons trouver $w_{i,p-l_i+1}$ de telle manière à choisir (s'il apparaissent ici) les $w_{j,p-l_j+1}$ égaux à zéro pour $j \neq i$ sans changer la valeur de ce coefficient. Nous pouvons continuer ainsi par récurrence croissante sur les coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$, pour voir que l'on peut trouver $w \in W'_\underline{l}$ tel que $h_\underline{l}(z) = h_\underline{l}(w)$, le système d'équations apparaissant ici étant triangulaire. Le morphisme $h_\underline{l}$ restreint à $W'_\underline{l}$ est donc fini.

Nous remarquons au passage, que le système d'équations obtenu des coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$ est triangulaire en les variables $z_{i,k}$ pour $p-l_i+1 \leq k \leq p-b_{k_i}(\underline{l})$, pour $p-e+1 \leq c \leq p$. Donc nous pouvons écrire $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ sous la forme $\bar{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{l_i-b_{k_i}(\underline{l})}$ où $\bar{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} = h_\underline{l}(W''_\underline{l})$.

Déterminons la fibre au-dessus d'un point de $\bar{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m}$. Remarquons que $k_i \leq k_\underline{l}$ car $b_{k_\underline{l}+1}(\underline{l}) > p-e = p-l_i+b_{k_i}(\underline{l}) \geq b_{k_i}(\underline{l})$. Soient z et w dans $W''_\underline{l}$ tels que $h_\underline{l}(z) = h_\underline{l}(w)$. Dans ce cas $z_{j,0}^n = w_{j,0}^n$ pour tout j et $z_{j,k} = w_{j,k}$ pour tout j et pour tout $1 \leq k \leq p-l_j$. Considérons alors le coefficient de t^c dans l'écriture de $\xi(z) = \xi(w)$. Pour $c = b_{k_1}(\underline{l})$, ce coefficient nous permet de dire que $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0}) = \varepsilon(w_{1,0}, \dots, w_{m,0})$ pour un $\varepsilon \in G_{k_1}$. Pour $b_{k_1}(\underline{l}) < c < b_{k_2}(\underline{l})$, ces coefficients n'apportent aucune information supplémentaire. Pour $c = b_{k_2}(\underline{l})$, coefficient nous permet de dire que $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0}) = \varepsilon(w_{1,0}, \dots, w_{m,0})$ pour un $\varepsilon \in G_{k_2}$. Par récurrence sur c , nous voyons alors que $(z_{1,0}, \dots, z_{m,0}) = \varepsilon(w_{1,0}, \dots, w_{m,0})$ pour un $\varepsilon \in G_{k_\underline{l}}$. Comme $l_j < +\infty$ pour tout j , le revêtement est étale et donc galoisien de groupe de Galois $G_{k_\underline{l}}$. $\square$

Nous avons alors

$$[\chi_{p,l_1,\dots,l_m}] = [\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m / G_{k_\underline{l}}] \mathbb{L}^{pm + \max\{l_i - b_{k_i}(\underline{l}), 0\} - \sum_{j=1}^m l_j}.$$

6.2. Cas C2. Soit $\underline{l} \in D_{q,i}(m)_p$ avec $q \geq 1$. Nous notons alors

$$W'_\underline{l} := \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{m-q+1} \times \left(\prod_{j \notin I_{\underline{l},p}} \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_j} \right) \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-b_{k_i}(\underline{l})}$$

et

$$W_{\underline{L}}'' := \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{m-q+1} \times \left(\prod_{j \notin I_{\underline{L},p}} \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{p-l_j} \right).$$

On considère sur $W_{\underline{L}}'$ les coordonnées $(z_{j_1,0}, \dots, z_{j_{m-q},0})$ sur le premier facteur (où $\{j_1, \dots, j_{m-q+1}\} = \{1, \dots, m\} \setminus \{I_{\underline{L},p} \setminus \{i\}\}$), les coordonnées $(z_{j,1}, \dots, z_{j,p-l_j})$ sur le $(j+1)$ -ième facteur pour $j \notin I_{\underline{L},p}$ et les coordonnées $(z_{i,1}, \dots, z_{i,p-b_{k_i}(\underline{L})})$ sur $(i+1)$ -ième facteur. On considère ces deux variétés plongées dans $W_{\underline{L}}$ en identifiant un élément de coordonnées

$$(z_{j_1,0}, \dots, z_{j_{m-q+1},0}, z_{j,1}, \dots, z_{j,p-l_j}, j \notin I_{\underline{L},p})$$

avec l'élément de $W_{\underline{L}}$ de coordonnées

$$(z_{1,0}, \dots, z_{m,0}, z_{j,1}, \dots, z_{j,p-l_j}, j \neq i, z_{i,1}, \dots, z_{i,p-b_{k_i}(\underline{L})})$$

en posant $z_{j,0} = 1$ et $z_{j,k} = 0$ si $j \in I_{p,\underline{L}}$ et $k \leq p-l_j$. Nous avons alors le résultat suivant :

Lemme 6.2. *Le morphisme $h_{\underline{L}}$ restreint à $W_{\underline{L}}'$ est fini et d'image $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$. Si nous notons $\overline{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} := h_{\underline{L}}(W_{\underline{L}}'')$, nous avons $\chi_{p,l_1,\dots,l_m} = \overline{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{l_i-b_{k_i}(\underline{L})}$ et $h_{\underline{L}}$ restreint à $W_{\underline{L}}''$ est un revêtement galoisien. Son groupe de Galois est le groupe $G_{k_i} \cap \mathbb{U}_n^{m-q+1}$, où $\mathbb{U}_n^{m-q+1}$ est le sous-groupe de $\mathbb{U}_n^m$ dont les éléments ont les coordonnées d'indice dans $I_{\underline{L},p} \setminus \{i\}$ égales à 0, et G_{k_i} est le sous-groupe de $\mathbb{U}_n^m$ formé des éléments $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-q+1})$ qui vérifient les équations $\prod_{j \notin I_{p,\underline{L}} \setminus \{i\}} \varepsilon_j^{na_r(j)} = 1$ pour $r = 1, \dots, k_i$ où $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n -ièmes de l'unité, qui agit par multiplication terme à terme sur $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{m-q}$.*

Démonstration. Nous allons d'abord montrer que l'image de $W_{\underline{L}}'$ par $h_{\underline{L}}$ est égale à $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$.

Soit $z = (z_1, \dots, z_m) \in W_{\underline{L}}$, et montrons que l'on peut trouver $w \in W_{\underline{L}}'$ ayant même image par $h_{\underline{L}}$ que z . En particulier nous avons

$$z_{j,0}^n \text{ est fixé si } l_j \leq p,$$

$$\left(1 + \sum_{k=1}^{p-l_j} z_{j,k} t^k \right)^n \bmod t^{p-l_j+1} \text{ est fixé si } l_j \leq p.$$

Les coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$, pour $c < b_{k_i}(\underline{L})$, ne dépendent que des $z_{j,k}$ pour $j \notin I_{p,\underline{L}}$ et $k \leq p$, d'après la remarque 5. Si $c = b_{k_i}(\underline{L})$, ce coefficient est de la forme

$$\prod_{j \neq i} z_{j,0}^{a_j(k_i)} \cdot z_{i,0}^{a_i(k_i)} + P$$

où P ne dépend que des $z_{j,k}$ pour $j \notin I_{\underline{L},p}$, $k \leq p-l_j+1$. Si nous posons $w_{j,0} = 1$ pour $j \in I_{p,\underline{L}} \setminus \{i\}$ et $w_{j,p-l_j+1} = 0$, il existe toujours un $w_{i,0}$ qui permet de garder la valeur de ce coefficient inchangée. Nous pouvons continuer ainsi par récurrence croissante sur les coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$, pour voir que l'on peut trouver $w \in W_{\underline{L}}'$ tel que $h_{\underline{L}}(z) = h_{\underline{L}}(w)$, le système d'équations apparaissant ici étant triangulaire. Le morphisme $h_{\underline{L}}$ restreint à $W_{\underline{L}}'$ est donc fini.

Nous remarquons au passage, que le système d'équations obtenu des coefficients de t^c dans l'écriture de $\xi(z)$ est triangulaire en les variables $z_{i,k}$, pour $0 \leq k \leq$

$p - b_{k_i}(\underline{L})$ et $b_{k_i}(\underline{L}) \leq c \leq p$. Donc nous pouvons écrire $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ sous la forme $\overline{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} \times \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{l_i - b_{k_i}(\underline{L})}$ où $\overline{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m} = h_{\underline{L}}(W_{\underline{L}}'')$. Comme précédemment nous voyons que deux éléments z et w de $W_{\underline{L}}''$ ont même image par $h_{\underline{L}}$ si et seulement si $z = \varepsilon w$ où $\varepsilon \in G_{k_i} \cap \mathbb{U}_n^{m-q+1}$. $\square$

Nous avons alors

$$[\chi_{p,l_1,\dots,l_m}] = [\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{m-q+1}/G_{k_i}'] \mathbb{L}^{p(m-q+1) - \sum_{j \notin I_{p,\underline{L}}} l_j - b_{k_i}(\underline{L})}.$$

6.3. Calcul de $\chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ et $\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}$. Nous allons maintenant énoncer un lemme utile pour achever le calcul :

Lemme 6.3. *Soit G un sous-groupe de $\prod_{i=1}^m \mathbb{U}_{n_i}$ agissant sur $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m$ par multiplication sur chaque terme. Alors la variété quotient $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m/G$ est isomorphe à $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m$.*

Démonstration. D'un point de vue torique, le cône associé à $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m$ est l'origine de $\mathbb{Z}^m$. Le semi-groupe de cette variété est donc $\mathbb{Z}^m$ en entier. L'ensemble des puissances des monômes invariants par l'action de G forment un semi-groupe N de $\mathbb{Z}^m$ qui est en fait un groupe car $X_1^{k_1} \dots X_m^{k_m}$ est invariant sous l'action de G si et seulement si $X_1^{-k_1} \dots X_m^{-k_m}$ l'est aussi. Donc N est isomorphe à $\mathbb{Z}^l$ pour $l \leq m$ et $N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^l$. Or pour tout i , $X_i^{n_i}$ est invariant par G donc $N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^m$ et $l = m$. Donc $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m/G$ est isomorphe à $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^m$. $\square$

Nous avons donc $[\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^r/G_k] = (\mathbb{L} - 1)^r$ et nous obtenons :

$$\text{pour le cas C1 : } [\chi_{p,l_1,\dots,l_m}] = (\mathbb{L} - 1)^m \mathbb{L}^{pm} \mathbb{L}^{-\sum_{j=1}^m l_j + \max\{l_i - b_{k_i}(\underline{L}), 0\}}.$$

$$\text{pour le cas C2 : } [\chi_{p,l_1,\dots,l_m}] = (\mathbb{L} - 1)^{m-q+1} \mathbb{L}^{p(m-q+1) - \sum_{j \notin I_{p,\underline{L}}} l_j - b_{k_i}(\underline{L})}.$$

Nous utilisons le même morphisme $h_{\underline{L}}$ pour calculer $\chi_c(\varphi_{p,l_1,\dots,l_m})$. En effet, dans le cas C1, la mesure arithmétique de l'image de $h_{\underline{L}}$ coïncide avec $\chi_c(\varphi_{p,l_1,\dots,l_m})$. Or $\varphi_{p,l_1,\dots,l_m} = \overline{\varphi}_{p,l_1,\dots,l_m} \wedge \varphi'$ où $\overline{\varphi}_{p,l_1,\dots,l_m}$ est la formule qui définit $\overline{\chi}_{p,l_1,\dots,l_m}$ et φ' est la formule qui définit $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^{\max\{l_i - b_{k_i}(\underline{L}), 0\}}$. La mesure arithmétique de $W_{\underline{L}}''$ est égale à $\mathbb{L}^{p(m-q) - \sum_{j \notin I_{p,\underline{L}}} l_j}$ car la formule qui définit $W_{\underline{L}}''$ est sans quantificateurs. Le morphisme $h_{\underline{L}}$ restreint à $W_{\underline{L}}''$ est un revêtement galoisien de groupe de Galois fini, de cardinal $n/n_{k_{\underline{L}}}$ dans le cas C1 et de cardinal $n(i, I_{p,\underline{L}})$ dans le cas C2 ($n(i, I_{p,\underline{L}})$ ne dépend que de i et de $I_{p,\underline{L}}$). La formule φ' est sans quantificateurs, donc sa mesure vaut $\mathbb{L}^{l_i - b_{k_i}(\underline{L})}$. Donc nous avons

$$\text{cas C1 : } \chi_c(\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}) = \frac{n_{k_{\underline{L}}}}{n} (\mathbb{L} - 1)^m \mathbb{L}^{pm} \mathbb{L}^{-\sum_{j=1}^m l_j + \max\{l_i - b_{k_i}(\underline{L}), 0\}}.$$

$$\text{cas C2 : } \chi_c(\varphi_{p,l_1,\dots,l_m}) = \frac{1}{n(i, I_{p,\underline{L}})} (\mathbb{L} - 1)^{m-q+1} \mathbb{L}^{p(m-q+1) - \sum_{j \notin I_{p,\underline{L}}} l_j - b_{k_i}(\underline{L})}.$$

7. ÉTUDE DE L'UNION (1)

L'union (1) n'est cependant pas toujours disjointe comme le montre l'exemple ci-dessous :

Exemple 7.1. Soit $f = Z^3 - XY$. Notons $h_1(t)$, $h_2(t)$ et $h_3(t)$ les arcs définis par $h_1(t) = (t^5, t^7, t^4)$, $h_2(t) = (t^6, t^6, t^4)$ et $h_3(t) = (t^7, t^5, t^4)$. Modulo t^5 , ces trois arcs ont la même troncation mais les ordres des différentes coordonnées ne coïncident pas. C'est-à-dire que $\chi_{4,5,7} \cap \chi_{4,6,6} \cap \chi_{4,7,5} \neq \emptyset$.

Néanmoins nous pouvons énoncer le résultat suivant :

Lemme 7.2. *Nous avons*

$$\begin{aligned} \chi_{p,l_1,\dots,l_m} = \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m} &\iff \chi_{p,l_1,\dots,l_m} \cap \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m} \neq \emptyset \\ &\iff \begin{cases} l_i \leq p \Rightarrow l_i = l'_i \\ l_i > p \Leftrightarrow l'_i > p \\ b_{r_{\underline{l}}}(\underline{l} - \underline{l}') = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

où $r_{\underline{l}}$ est l'entier k_i si $l_i > p$ (voir remarque 4).

Démonstration. Il est clair que

$$\chi_{p,l_1,\dots,l_m} = \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m} \implies \chi_{p,l_1,\dots,l_m} \cap \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m} \neq \emptyset.$$

L'implication

$$\chi_{p,l_1,\dots,l_m} \cap \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m} \neq \emptyset \implies \begin{cases} b_{r_{\underline{l}}}(\underline{l} - \underline{l}') = 0, \\ l_i \leq p \Rightarrow l_i = l'_i \\ l_i > p \Leftrightarrow l'_i > p \end{cases}$$

découle de la remarque faite à la fin de la preuve de la proposition 5.1.

Fixons $(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M$ et $(l'_1, \dots, l'_m) \in \text{Ker } M$. Supposons que nous ayons $b_{r_{\underline{l}}}(\underline{l} - \underline{l}') = 0$, $l_i \leq p \Rightarrow l_i = l'_i$ et que $l_i > p \Leftrightarrow l'_i > p$. Supposons qu'il existe un entier i pour lequel $l_i > p$. Dans le cas contraire les équivalences sont triviales. Soient $h \in \chi_{p,l_1,\dots,l_m}$ et $\bar{h}$ un arc égal à h modulo $(t)^{p+1}$ et dont chaque composante x_i est d'ordre l_i pour $1 \leq i \leq m$. Nous avons donc $\bar{h}(t) = (x_1(t), \dots, x_m(t), z(t))$ et nous pouvons supposer, quitte à changer les variables, que $x_1(t) = \dots = x_k(t) = 0$ modulo $(t)^{p+1}$, et que $x_{k+1}(t), \dots, x_m(t)$ sont non nuls modulo $(t)^{p+1}$ (c'est-à-dire que $l_1, \dots, l_k > p$ et $l_{k+1}, \dots, l_m \leq p$). Nous allons chercher des $x'_i(t)$, avec $\text{ord}(x'_i(t)) = l'_i$ pour $1 \leq i \leq m$, tels que

$$\xi(x^{1/n}(t)) = \xi(x'^{1/n}(t)).$$

Pour cela, il nous suffit de poser $x'_i(t) = x_i(t)$ pour tout i compris entre $k+1$ et m , et de voir que cela revient alors à trouver des $x'_i(t)$ tels que

$$(3) \quad \xi_{k_i}(x^{1/n}(t)) + \xi_{k_i+1}(x^{1/n}(t)) + \dots = \xi_{k_i}(x'^{1/n}(t)) + \dots.$$

Il suffit pour cela de trouver x'_{i,l'_i} pour $k+1 \leq i \leq m$ tels que $\prod_i x_{i,l_i}^{a_i(k_i)} = \prod_i x'_{i,l'_i}{}^{a_i(k_i)}$ ce qui est toujours possible. Ensuite il suffit de choisir les $x'_{i,k}$ pour $k > l'_i$ ce qui est toujours possible car les équations en les $x'_{i,k}$, qui découlent de l'annulation des différents termes de l'équation 3, forment un système triangulaire. Donc $h \in \chi_{p,l'_1,\dots,l'_m}$.

□

Exemple 7.3. Si pour tous i et j tels que $i \neq j$ nous avons $a_i(1) + a_j(1) \geq 1$, alors l'union (1) précédente est disjointe.

Nous allons alors noter :

$$N_{p, l_1, \dots, l_m} := \text{Card} \left\{ \text{Ker}(b_{p, l_1, \dots, l_m}) \cap \prod_{i \in I_{p, \underline{l}}} (\mathbb{Z} \cap] - \infty, l_i - p[) \right\}$$

où $I_{p, \underline{l}} = \{i_1, \dots, i_q\}$ est l'ensemble des indices i pour lesquels $l_i > p$ et $b_{p, l_1, \dots, l_m}$ est l'application linéaire

$$b_{p, l_1, \dots, l_m} : \mathbb{Z}^q \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$(u_1, \dots, u_q) \longmapsto na_{i_1}(r_{\underline{l}})u_1 + \dots + na_{i_q}(r_{\underline{l}})u_q$$

D'après le lemme précédent, nous voyons que $\chi_{p, l_1, \dots, l_m} = \chi_{p, l'_1, \dots, l'_m}$ si seulement si $(l_1 - l'_1, \dots, l_m - l'_m) \in \text{Ker}(b_{p, l_1, \dots, l_m}) \cap \prod_{i \in I_{p, \underline{l}}} (\mathbb{Z} \cap] - \infty, l_i - p[)$.

La mesure motivique des p -truncations d'arcs qui ne se relèvent pas en arcs dont l'une des coordonnées x_i est nulle est alors égale à :

$$(4) \quad \left[\bigcup_{(l_1, \dots, l_m) \in D(m)_p} \chi_{p, l_1, \dots, l_m} \right] = \sum_{(l_1, \dots, l_m) \in D(m)_p} \frac{[\chi_{p, l_1, \dots, l_m}]}{N_{p, l_1, \dots, l_m}}$$

Exemple 7.4. Dans le cas $Z^3 = XY$, nous avons

$$N_{4, 5, 7} = \text{Card} \left\{ \text{Ker}(1, 1) \cap ((\mathbb{Z} \cap] - \infty, 1[) \times (\mathbb{Z} \cap] - \infty, 3[)) \right\}.$$

Cet ensemble est formé de trois points : le point $(0, 0)$ correspond à $\chi_{4, 5, 7}$, le point $(1, -1)$ correspond à $\chi_{4, 6, 6}$ et le point $(2, -2)$ correspond à $\chi_{4, 7, 5}$. Et donc le cardinal de cet ensemble vaut 3.

8. ÉTUDE DES TRUNCATIONS D'ARCS POUR LESQUELS UN DES $x_i(t)$ EST NUL

Ce terme correspond aux truncations d'arcs pour lesquels un des $x_i(t)$ est nul. Nous allons exprimer le terme $[X(a(1), \dots, a(g))_{p, cn}]$ en fonction de différents termes de la forme $[\pi_p(X(b(1), \dots, b(i))_\infty)]$ pour $i < g$.

Rappelons que pour tout i compris entre 1 et m , k_i est le plus petit entier qui vérifie $a_i(k_i) \neq 0$ et que nous avons

$$1 = k_1 = k_2 = \dots = k_{i_0} < k_{i_0+1} \leq k_{i_0+2} \leq \dots \leq k_m \leq g$$

Soit $i \in \{1, \dots, m\}$. Que vaut $[\chi_{p, l_1, \dots, l_m}]$ où $l_i = +\infty$ et $l_j < +\infty$ pour $j < i$?

Si $i > i_0$ les x_j pour $j > i$ peuvent être choisis quelconques et

$$[\chi_{p, l_1, \dots, l_m}] = \mathbb{L}^{p(m-i)} [\pi_p(X(a^i(1), \dots, a^i(k_i - 1))_\infty)]$$

avec $a^i(j) = (a_1(j), \dots, a_{k_i-1}(j))$ pour $1 \leq j \leq k_i - 1$. Le germe de variété $X(a^i(1), \dots, a^i(k_i - 1))$ n'est peut-être pas réduit mais il reste irréductible car ses exposants caractéristiques sont conjugués.

Si $i \leq i_0$, les x_j pour $j \neq i$ peuvent être choisis quelconques mais les x_j pour $j < i$ doivent être non nuls donc $[\chi_{p, l_1, \dots, l_m}] = \mathbb{L}^{p(m-i)} (\mathbb{L}^p - 1)^{i-1}$.

Nous avons donc

$$(5) \quad [X(a(1), \dots, a(g))_{p,cn}] = \sum_{i=1}^{i_0} \mathbb{L}^{p(m-i)} (\mathbb{L}^p - 1)^{i-1} \\ + \sum_{i=i_0+1}^m \mathbb{L}^{p(m-i)} [\pi_p(X(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1))_\infty)],$$

et

$$(6) \quad P_{geom}^{tore^c}(a(1), \dots, a(m))(T) = \sum_{i=0}^{i_0-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} \\ + \sum_{i=i_0+1}^m P_{geom, X(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1)), 0}(\mathbb{L}^{m-i} T).$$

En suivant le même raisonnement nous obtenons

$$(7) \quad \chi_c(\varphi_{p,cn}(a(1), \dots, a(m))) = \sum_{i=1}^{i_0} \mathbb{L}^{p(m-i)} (\mathbb{L}^p - 1)^{i-1} \\ + \sum_{i=i_0+1}^m \mathbb{L}^{p(m-i)} \chi_c(\varphi_p(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1))),$$

et

$$(8) \quad P_{arit}^{tore^c}(a(1), \dots, a(m))(T) = \sum_{i=0}^{i_0-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} \\ + \sum_{i=i_0+1}^m P_{arit, X(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1)), 0}(\mathbb{L}^{m-i} T).$$

9. RÉSULTAT PRINCIPAL

Nous pouvons alors donner la forme générale des deux séries étudiées :

Théorème 9.1. *Soit $(X, 0)$ un germe d'hypersurface irréductible quasi-ordinaire d'exposants caractéristiques $a(1), \dots, a(g)$. Nous avons alors les relations de récurrence suivantes*

$$(9) \quad P_{geom, X(a(1), \dots, a(g)), 0}(T) = (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{i=1}^m \sum_{p \geq 0} \mathbb{L}^{pm} T^p \\ \times \sum_{(l_1, \dots, l_m) \in D_{0,i}(m)_p} \mathbb{L}^{-\sum_{j=1}^m l_j + \max\{l_i - b_{k_i}(\mathbb{L}), 0\}} + \\ + \sum_{q=1}^m \sum_{i=1}^m (\mathbb{L} - 1)^{m-q+1} \sum_{p \geq 0} (\mathbb{L}^{m-q+1} T)^p \times \sum_{(l_1, \dots, l_m) \in D_{q,i}(m)_p} \frac{\mathbb{L}^{-\sum_{j \notin I_{p,\mathbb{L}}} l_j - b_{k_i}(\mathbb{L})}}{N_{p, l_1, \dots, l_m}} + \\ + \sum_{i=0}^{i_0-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} + \sum_{i=i_0+1}^m P_{geom, X(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1)), 0}(\mathbb{L}^{m-i} T)$$

$$\begin{aligned}
P_{arit, X(a(1), \dots, a(g)), 0}(T) &= (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{k=0}^g \frac{n_{k_l}}{n} \sum_{i=1}^m \sum_{p \geq 0} \mathbb{L}^{pm} T^p \\
&\quad \times \sum_{(l_1, \dots, l_m) \in D_{0,i}(m)_p} \mathbb{L}^{-\sum_{j=1}^m l_j + \max\{l_i - b_{k_i}(\underline{l}), 0\}} + \\
(10) \quad &+ \sum_{k=0}^g \sum_{q=1}^m \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in I, \#I = q}} (\mathbb{L} - 1)^{m-q+1} \sum_{p \geq 0} (\mathbb{L}^{m-q+1} T)^p \times \\
&\quad \times \sum_{(l_1, \dots, l_m) \in D_{q,i,I}(m)_p} \frac{1}{n(i, I_p, \underline{l})} \frac{\mathbb{L}^{-\sum_{j \notin I_p, \underline{l}} l_j - b_{k_i}(\underline{l})}}{N_{p, l_1, \dots, l_m}} + \\
&+ \sum_{i=0}^{i_0-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} + \sum_{i=i_0+1}^m P_{geom, X(a^i(1), \dots, a^i(k_i-1)), 0}(\mathbb{L}^{m-i} T)
\end{aligned}$$

où

$$D(m)_p := \{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M / 0 < l_i \leq p\}$$

$$\bigcup_{i=1}^m \left(\bigcup_{j=i+1}^m \{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M / l_i > p, l_j \leq p, j = i+1, \dots, m, b_{k_i}(\underline{l}) \leq p\} \cap (\mathbb{N}^*)^m \right),$$

$I_{p, \underline{l}}$ est l'ensemble des indices j pour lesquels $l_j > p$,

$$D_{0,i}(m)_p := \{\underline{l} \in D(m)_p \setminus l_j \leq p \ \forall j, \ l_i - b_{k_i}(\underline{l}) \geq l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j \neq i$$

$$\text{et } l_i - b_{k_i}(\underline{l}) > l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j < i\},$$

$$D_{q,i}(m)_p := \{\underline{l} \in D(m)_p \setminus l_i > p, \text{Card}(I_{p, \underline{l}}) = q, \ l_i - b_{k_i}(\underline{l}) \geq l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j \neq i$$

$$\text{et } l_i - b_{k_i}(\underline{l}) > l_j - b_{k_j}(\underline{l}) \ \forall j < i\}.$$

$$D_{q,i,I}(m)_p := \{\underline{l} \in D(m)_{q,i}(m)_p \setminus I_{p, \underline{l}} = I\},$$

$$\begin{aligned}
\text{et } M : \mathbb{Z}^m &\longrightarrow \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^g \\
(l_1, \dots, l_m) &\longmapsto (n \sum a_i(1) l_i, \dots, n \sum a_i(g) l_i)
\end{aligned}$$

10. CAS OÙ LES $a_i(1) \geq 1$ POUR TOUT i

Dans ce cas beaucoup de choses peuvent être simplifiées, et nous pouvons donner une expression explicite de ces deux séries. Tous les k_j sont égaux à 1, et $b_1(\underline{l}) \geq l_j$ pour tout j , si $l_j > 0$ pour tout j . En particulier, si $l_i > p$, alors $b_{k_i}(\underline{l}) > p$ et seul le cas C1 est à considérer ici. D'autre part $e = 0$. Nous avons

$$D(m)_p = \{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M / 0 < l_i \leq p\}.$$

Notons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_p := & \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i}
\end{aligned}$$

$$\text{et } \mathbb{F}_{k,p} := \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p \\ b_k(\underline{l}) \leq p}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} .$$

Nous avons alors

$$P_{geom}^{tore}(a(1), \dots, a(m))(T) = (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p \geq 0} \mathbb{E}_p(\mathbb{L}^m T)^p$$

et

(11)

$$\begin{aligned} P_{arit}^{tore}(a(1), \dots, a(m))(T) &= \sum_{k=1}^{g-1} (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p \geq 0} (\mathbb{L}^m T)^p (\mathbb{F}_{k,p} - \mathbb{F}_{k+1,p}) \\ &\quad + (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p \geq 0} (\mathbb{L}^m T)^p \mathbb{F}_{g,p} + (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p \geq 0} (\mathbb{E}_p - \mathbb{F}_{1,p})(\mathbb{L}^m T)^p \\ &= (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p \geq 0} \mathbb{E}_p(\mathbb{L}^m T)^p + (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{k=1}^g \left(\frac{n_k - n_{k-1}}{n} \right) \sum_{p \geq 0} \mathbb{F}_{k,p}(\mathbb{L}^m T)^p . \end{aligned}$$

Pour calculer ces séries, notons

$$\mathbb{E}_{\underline{p}} = \mathbb{E}_{p_1, \dots, p_m} = \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p_i}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^m l_i} .$$

Nous avons alors le lemme suivant

Lemme 10.1. *Nous avons pour tout $n \geq p_k > 0$, $p > 0$, $k \geq 0$:*

(1)

$$\mathbb{E}_p = \mathbb{E}_{p, \dots, p} ,$$

(2)

$$\mathbb{E}_{p_1, \dots, p_j + kn, \dots, p_m} = \mathbb{E}_{p_1, \dots, kn, \dots, p_m} + \mathbb{L}^{-kn} \mathbb{E}_{p_1, \dots, p_j, \dots, p_m} ,$$

(3)

$$\mathbb{E}_{p_1, \dots, kn, \dots, p_m} = \frac{1 - \mathbb{L}^{-kn}}{1 - \mathbb{L}^{-n}} \mathbb{E}_{p_1, \dots, n, \dots, p_m} ,$$

(4)

$$\mathbb{E}_{p_1, \dots, p_j + kn, \dots, p_m} = \frac{1 - \mathbb{L}^{-kn}}{1 - \mathbb{L}^{-n}} \mathbb{E}_{p_1, \dots, n, \dots, p_m} + \mathbb{L}^{-kn} \mathbb{E}_{p_1, \dots, p_j, \dots, p_m} .$$

Notons $\mathcal{S}_m := \{s : \{1, \dots, m\} \longrightarrow \{0, 1\}^m\}$. Pour tout $s \in \mathcal{S}_m$, nous noterons $|s|$ le nombre d'éléments de $\{1, \dots, m\}$ d'image 1 par s . Nous avons alors

$$\mathbb{E}_{\underline{p} + n\underline{k}} = \sum_{s \in \mathcal{S}_m} \mathbb{L}^{\sum_i -k_i n(1-s(i))} \mathbb{E}_{p_1(1-s(1)) + k_1 n s(1), \dots, p_m(1-s(m)) + k_m n s(m)} .$$

En notant $\mathbb{E}_{p,s} = \mathbb{E}_{p(1-s(1)) + ns(1), \dots, p(1-s(m)) + ns(m)}$, nous avons

$$\mathbb{E}_{p+nk} = \sum_{s \in \mathcal{S}_m} \left(\frac{\mathbb{L}^{-kn} - 1}{\mathbb{L}^{-n} - 1} \right)^{|s|} \mathbb{L}^{-kn(m-|s|)} \mathbb{E}_{p,s} .$$

Démonstration. Le 1. découle des définitions.

Il faut tout d'abord remarquer que nous avons $M(l_1, \dots, l_m) = 0$ si et seulement si $M(l_1, \dots, l_i + ln, \dots, l_m) = 0$ pour tout i et tout l entier. Le 2. découle alors de l'égalité suivante :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{p_1, \dots, p_j + kn, \dots, p_m} &= \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p_i \ i \neq j \\ 0 < l_j \leq p_j + kn}} \mathbb{L}^{\sum_{i=1}^p -l_i} \\ &= \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p_i \ i \neq j \\ 0 < l_j \leq kn}} \mathbb{L}^{\sum_{i=1}^p -l_i} + \mathbb{L}^{-kn} \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq p_i}} \mathbb{L}^{\sum_{i=1}^p -l_i} . \end{aligned}$$

Le 3. s'en déduit par récurrence et le 4. en compilant 2. et 3. □

Corollaire 10.2. *Nous avons*

$$\sum_{p \geq 0} \mathbb{E}_p(\mathbb{L}^m T)^p = \sum_{p=1}^n \sum_{s \in \mathcal{S}_m} (\mathbb{L}^m T)^p \frac{\mathbb{E}_{p,s}}{(\mathbb{L}^{-n} - 1)^{|s|}} \sum_{j=0}^{|s|} \frac{C_{|s|}^j (-1)^j}{1 - (\mathbb{L}^j T)^n} .$$

Démonstration. Nous avons

$$\begin{aligned} \sum_{p \geq 0} \mathbb{E}_p(\mathbb{L}^m T)^p &= \sum_{p=1}^n \sum_{k \geq 0} (\mathbb{L}^m T)^{kn+p} \mathbb{E}_{p+kn} \\ &= \sum_{p=1}^n (\mathbb{L}^m T)^p \sum_{s \in \mathcal{S}_m} \sum_{k \geq 0} (\mathbb{L}^m T)^{nk} \left(\frac{\mathbb{L}^{-kn} - 1}{\mathbb{L}^{-n} - 1} \right)^{|s|} \mathbb{L}^{-kn(m-|s|)} \mathbb{E}_{p,s} . \end{aligned}$$

Le résultat est alors direct en développant $\left(\frac{\mathbb{L}^{-kn} - 1}{\mathbb{L}^{-n} - 1} \right)^{|s|}$ et sommant sur k . □

Pour calculer les séries où apparaissent les $\mathbb{F}_{k,p}$ nous pouvons remarquer comme tous les $a_i(k) \geq 1$ que

$$\mathbb{F}_{k,p} = \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \\ b_k(\mathbb{L}) \leq p}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} .$$

Donc nous avons

$$\begin{aligned} \sum_{p \geq 0} \mathbb{F}_{k,p}(\mathbb{L}^m T)^p &= \sum_{p \geq 0} \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \\ b_k(\mathbb{L}) \leq p}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^p \\ &= \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i}} \sum_{p \geq b_k(\mathbb{L})} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i}} \frac{\mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^{b_k(\mathbb{L})}}{1 - \mathbb{L}^m T} \\
&= \sum_{r_i \geq 0} \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq n}} \frac{\mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^{b_k(\mathbb{L})}}{1 - \mathbb{L}^m T} \mathbb{L}^{-n \sum_{i=1}^p r_i} (\mathbb{L}^m T)^{nb_k(\mathbb{L})} .
\end{aligned}$$

Car $(l_1 + nr_1, \dots, l_m + nr_m) \in \text{Ker } M \iff (l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M$. Nous avons donc

$$\begin{aligned}
&\sum_{p \geq 0} \mathbb{F}_{k,p} (\mathbb{L}^m T)^p = \\
&= \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq n}} \frac{\mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^{b_k(\mathbb{L})}}{1 - \mathbb{L}^m T} \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 - \mathbb{L}^{n(ma_i(k)-1)} T^{na_i(k)}} .
\end{aligned}$$

Nous pouvons alors en déduire le

Théorème 10.3. *Soit $(X, 0)$ est un germe irréductible à singularité quasi-ordinaire tel que $a_i(1) \geq 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, m\}$. Alors nous avons*

$$\begin{aligned}
(12) \quad P_{\text{geom}, X, 0}(T) &= \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} \\
&+ (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p=1}^n \sum_{s \in \mathcal{S}_m} (\mathbb{L}^m T)^p \frac{\mathbb{E}_{p,s}}{(\mathbb{L}^{-n} - 1)^{|s|}} \sum_{j=0}^{|s|} \frac{C_{|s|}^j (-1)^j}{1 - (\mathbb{L}^j T)^n} ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(13) \quad P_{\text{arit}, X, 0}(T) &= \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^i \frac{C_i^{i-j} (-1)^j}{1 - \mathbb{L}^{m-j-1} T} \\
&+ \frac{1}{n} (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{p=1}^n \sum_{s \in \mathcal{S}_m} (\mathbb{L}^m T)^p \frac{\mathbb{E}_{p,s}}{(\mathbb{L}^{-n} - 1)^{|s|}} \sum_{j=0}^{|s|} \frac{C_{|s|}^j (-1)^j}{1 - (\mathbb{L}^j T)^n} \\
&+ (\mathbb{L} - 1)^m \sum_{k=1}^g \left(\frac{n_k - n_{k-1}}{n} \right) \frac{\mathbb{H}_k}{1 - \mathbb{L}^m T} \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 - \mathbb{L}^{n(ma_i(k)-1)} T^{na_i(k)}}
\end{aligned}$$

où $\mathbb{E}_{p,s}$ et $\mathbb{E}_{p,s}$ sont définis lemme 10.1 et

$$\mathbb{H}_k := \sum_{\substack{(l_1, \dots, l_m) \in \text{Ker } M \\ 0 < l_i \leq n}} \mathbb{L}^{-\sum_{i=1}^p l_i} (\mathbb{L}^m T)^{b_k(\mathbb{L})}$$

10.1. Exemples.

10.1.1. *Courbes planes.* Considérons un germe de courbe plane de caractéristique $(\beta_0 = n, \beta_1, \dots, \beta_g)$ [Z]. Nous avons alors $n = n$, $m = 1$ et $g = g$. De plus

$$l \in \text{Ker } M \iff l \in n\mathbb{Z}.$$

Nous obtenons alors

$$P_{\text{geom},X,0}(T) = \frac{1}{1-T} + \frac{\mathbb{L}-1}{1-\mathbb{L}T} \frac{T^n}{1-T^n}$$

et $P_{\text{arit},X,0}(T) = \frac{1}{1-T} + \frac{\mathbb{L}-1}{1-\mathbb{L}T} \sum_{k=0}^g \left(\frac{n_k - n_{k-1}}{n} \right) \frac{\mathbb{L}^{\beta_k - n} T^n}{1 - \mathbb{L}^{\beta_k - n} T^n}.$

On retrouve là le résultat de Denef et Loeser [DL2].

10.1.2. *L'hypersurface définie par $Z^2 - X^3 Y^3 = 0$.* Soit l'hypersurface de $\mathbb{C}^3$ définie par $Z^2 - X^3 Y^3 = 0$. La série fractionnaire associée est $\xi = X^{3/2} Y^{3/2}$. Dans ce cas nous avons $n = 2$, $m = 2$, $g = 1$, $n_1 = 2$ et

$$\begin{aligned} M : \mathbb{Z}^2 &\longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \\ (l_1, l_2) &\longmapsto 3l_1 + 3l_2 \end{aligned}$$

Nous avons

$$(l_1, l_2) \in \text{Ker } M \iff l_1 + l_2 \in \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}.$$

Soit $p \in \{1, 2\}$, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{1,(0,0)} &= \mathbb{E}_{1,(1,0)} = \mathbb{E}_{1,(0,1)} = \mathbb{L}^{-2}, \\ \mathbb{E}_{2,(0,0)} &= \mathbb{E}_{2,(0,1)} = \mathbb{E}_{2,(1,0)} = \mathbb{E}_{2,(1,1)} = \mathbb{E}_{1,(1,1)} = \mathbb{L}^{-2} + \mathbb{L}^{-4}. \end{aligned}$$

D'où

$$(1 + \mathbb{L})^2 P_{\text{geom},X,0}(T) = \frac{-2\mathbb{L}}{1-T} + \frac{(1+\mathbb{L})^2}{1-\mathbb{L}T} - \frac{(1-\mathbb{L})^2}{1+\mathbb{L}T} + \frac{1+\mathbb{L}^2}{1-\mathbb{L}^2 T}.$$

Dans ce cas, la série géométrique a 4 pôles en $T : 1, \mathbb{L}^{-1}, -\mathbb{L}^{-1}$ et $\mathbb{L}^{-2}$.

RÉFÉRENCES

- [Ab] S. S. Abhyankar, On the ramification of algebraic functions, *Amer. J. of Math.*, **77**, 575-592, 1955.
- [ACLM] E. Artal Bartolo, Pi. Cassou-Noguès, I. Luengo, A. Melle Hernández, Quasi-ordinary power series and their zeta functions, prépublication ArXiv, (2004).
- [D] J. Denef, The rationality of the Poincaré series associated to the p -adic points on a variety, *Invent. Math.*, **77**, (1984), 1-23.
- [DL1] J. Denef - F. Loeser, Germs of arcs on singular algebraic varieties and motivic integration, *Invent. math.*, **135**, (1999), 201-232.
- [DL2] J. Denef - F. Loeser, Definable sets, motives and p -adic integrals, *J. Am. Math. Soc.*, **14**, (2001), 429-469.
- [DL3] J. Denef - F. Loeser, Geometry on arc spaces of algebraic varieties, European Congress of Mathematics, Vol. I (Barcelona, 2000), 327-348, Progr. Math., **201**, Birkhäuser, Basel, 2001.
- [Fu] W. Fulton, Introduction to Toric Varieties, Ann. of Math. Studies, 1993.
- [Ga] Y.-N. Gau, Embedded topological classification of quasi-ordinary singularities, *Memoirs of the American Mathematical Society*, **388**, 1988.
- [G-P1] P. D. Gonzalez Perez, The semigroup of a quasi-ordinary hypersurface, *J. Inst. Math. Jussieu*, **2**, 383-399, 2003.

- [G-P2] P. D. Gonzalez Perez, Toric embedded resolutions of quasi-ordinary hypersurface singularities, *Ann. Inst. Fourier*, **53**, 1819-1881, 2003.
- [Gr] M. J. Greenberg, Rational points in henselian discrete valuation rings, *Publ. Math. IHES*, **31**, 59-64, 1966.
- [Ha] T. Hales, What is motivic measure?, prépublication ArXiv.
- [Kon] M. Kontsevich, Cours à Orsay, 7 décembre 1995.
- [LJ2] M. Lejeune-Jalabert, La série de Denef-Loeser d'une branche plane (Notes informelles), 2001.
- [LJ-R1] M. Lejeune-Jalabert, A. Reguera, Arcs and wedges on sandwiched surface singularities, *Amer. J. Math.*, **121**, no. 6, 1191-1213, 1999.
- [LJ-R2] M. Lejeune-Jalabert, A. Reguera, The Denef-Loeser series for toric surface singularities, *Revista Matematica Iberoamericana*, 2002.
- [Li1] J. Lipman, *Quasi-ordinary singularities of embedded surfaces*, Thèse, Université de Havard, 1965.
- [Li2] J. Lipman, *Topological invariants of quasi-ordinary surfaces*, Memoirs of the American Mathematical Society, **388**, 1988.
- [Ni1] J. Nicaise, Motivic generating series for toric surfaces singularities, à paraître dans *the Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*.
- [Ni2] J. Nicaise, Arcs and resolution of singularities, à paraître dans *Manuscripta Mathematica*.
- [Pa] J. Pas, Uniform p -adic cell decomposition and local zeta functions, *J. reine angew. Math.*, **399**, 137-172, 1989.
- [Z] O. Zariski, Le Problème des modules pour les branches planes, cours de l'Ecole Polytechnique, 1973.

DEPARTMENT OF MATHEMATICS
 UNIVERSITY OF TORONTO
 TORONTO, ONTARIO
 CANADA M5S 3G3
E-mail address: rond@picard.ups-tlse.fr